

KOMUNIKAT PYŁKOWY DLA ALERGIKÓW – RYNEK GŁÓWNY

Z DNIA 29 MARCA 2011 R.

Trwa sezon pyłkowy drzew wczesnowiosennych. Stężenie pyłku olszy i leszczyny waha się między wysokim i średnim, przewiduje się stopniowy spadek stężenia. Stężenie pyłku cisu i wiązu utrzymuje się na średnim poziomie, a stężenie wierzby jest niskie i będzie wzrastać.

Stężenie zarodników grzybów alergennych jest niskie.

Pacjenci uczuleni na pyłek drzew są proszeni o stosowanie się do zaleceń lekarskich.

TAKSON	STĘŻENIE	PROGNOZA
OLSZA	WYSOKIE	spadek
LESZCZYNA	WYSOKIE	spadek
WIĄZ	ŚREDNIE	bez zmian
CIS	ŚREDNIE	bez zmian
WIERZBA	NISKIE	wzrost
<i>Alternaria</i>	NISKIE	wzrost
<i>Cladosporium</i>	NISKIE	wzrost

TAKSON	STĘŻENIE	PROGNOZA
OLSZA		↓
LESZCZYNA		↓
WIĄZ		—
CIS		—
WIERZBA		↑
<i>Alternaria</i>		↑
<i>Cladosporium</i>		↑